

ANTECEDENTES

- ▶ Tumor de transmisión sexual con células trasplantadas a través del contacto directo con un perro afectado
- ▶ La mayoría son perros enteros callejeros o que vagan libremente



SIGNOS CLÍNICOS

- ▶ Aspecto de coliflor, pedunculado, nodular, papilar o multilobulado; con sangrado intermitente del prepucio/área de la vulva
- ▶ El tamaño varía desde un pequeño nódulo (5 mm) hasta una gran masa (> 10 cm) que es firme, a menudo ulcerada y friable
- ▶ Localización: más comúnmente genital, facial
- ▶ Síndromes paraneoplásicos: eritrocitosis

DIAGNÓSTICO

- ▶ Por citología de aspiración con aguja fina, el frotis de impresión es diagnóstico con menos frecuencia. Flushing en TVT nasal
- ▶ La histología está indicada si la citología no es diagnóstica o la presentación es atípica



TERAPIA

- ▶ ¡Vincristina es el tratamiento de elección! 0,5-0,7mg/m² semanalmente durante 3-8 semanas o 2 semanas después de la resolución completa del tumor visible
- ▶ Se puede usar radioterapia u otros agentes citostáticos como doxorubicina, ciclofosfamida, metotrexato, vinblastina en casos que no responden
- ▶ Cirugía menos efectiva con tasa de recurrencia superior al 60%



PRONÓSTICO

Excelente. Los perros se pueden curar con quimioterapia.
Pronóstico más cuidadoso en perros inmunocomprometidos

