

## 背景

- ▶ 在母貓中, 幾乎 90% 的乳房腫瘤是惡性的
- ▶ 早期絕育 (<1 歲) 可降低日後的風險
- ▶ 避孕會增加良性和惡性腫瘤的風險
- ▶ 在雄貓中罕見, 但在甲經孕酮治療(口服避孕藥)後可能會發展為惡性腫瘤

## 臨床表徵

- ▶ 乳房內或附近的腫塊
- ▶ 通常, 在皮下組織且無痛感; 有時會出現潰瘍和疼痛

乳腺內的任何腫塊, 無論其大小, 都應進行檢查

## 診斷

- ▶ 細胞學檢查以排除其他腫瘤或非腫瘤性病變
- ▶ 需組織學檢查才能明確診斷

## 分期

- ▶ 3 視圖胸部 X 光片
- ▶ 腫大的淋巴結用細針抽吸
- ▶ 腹部超音波或全身 CT 掃描 (用於分期/計畫)

## 治療

- ▶ 雙側或 2 次單側分期乳房切除術 (間隔 4-6 週)
- ▶ 如果是分期高、淋巴結轉移或有組織學侵犯, 可能加以使用輔助化療 (卡鉑或多柔比星為基礎的抗癌藥物方案)
- ▶ 可以考慮節律式化療方案 (環磷醯胺加 Cox-2 抑制劑)



## 負面預後因素

- ▶ 腫瘤 (> 3公分)
- ▶ 遠端或淋巴結轉移
- ▶ 淋巴管和血管侵犯

## 預後

- ▶ 多變的
- ▶ 對於較小的腫塊, 快速手術切除腫塊可能會治愈

