

Arkusz informacyjny dla zespołu weterynaryjnego: Guzy gruczołu mlekowego u kotów

INFORMACJE OGÓLNE

- ▶ U kotek prawie 90% guzów sutka ma charakter złośliwy.
- ▶ Wczesna sterylizacja (< 1 roku życia) zmniejsza ryzyko w późniejszym życiu.
- ▶ Środki antykoncepcyjne zwiększają ryzyko zarówno łagodnych, jak i złośliwych guzów.
- ▶ Rzadko u samców, ale nowotwory złośliwe mogą rozwinąć się po leczeniu octanem medroksyprogesteronu.

OBJAWY KLINICZNE

- ▶ Guz w obrębie lub w pobliżu gruczołu sutkowego.
- ▶ Zwykle podskórny i bezbolesny; czasem owrzodziały i bolesny.
- ▶ Każdy guz zlokalizowany w gruczołach sutkowych, niezależnie od wielkości, powinien zostać zbadany.

ROZPOZNANIE

- ▶ Cytologia zmiany w celu wykluczenia innych nowotworów lub zmian nienowotworowych.
- ▶ Do ostatecznego rozpoznania wymagana jest histopatologia.

STOPNIOWANIE

- ▶ Trzy projekcje RTG klatki piersiowej.
- ▶ Cienkoigłowa aspiracja powiększonych węzłów chłonnych.
- ▶ USG jamy brzusznej lub tomografia komputerowa całego ciała (do stageru/planowania).

LECZENIE

- ▶ Obustronna lub dwukrotna jednostronna mastektomia etapowa (w odstępie 4–6 tygodni).
- ▶ Rozważyć adiuwantową chemioterapię (protokoły oparte na karboplatynie lub doksorubicynie) dla przypadków guzów wysokiego stopnia złośliwości, z przerzutami do węzłów chłonnych lub histologicznie inwazyjnych
- ▶ Ewentualnie metronomiczne protokoły chemioterapii (cyklofosfamid plus inhibitory COX-2).

CZYNNIKI ZŁEGO ROKOWANIA

- ▶ Guz (> 3 cm), przerzuty odległe lub do węzłów chłonnych, inwazja do naczyń limfatycznych i krwionośnych.



ROKOWANIE

- ▶ Zmienne. W przypadku mniejszych zmian szybkie chirurgiczne usunięcie guza może prowadzić do wyleczenia.

